

Risc de mortalitat en cronicitat segons l'entorn d'atenció a la persona

M Medina, M Torres, S Sánchez-Coll, A Casellas, E Martínez-Solanas, D Piedra, A Dalmau-Bueno, M Espallargues

Salut/Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya

Generalitat de Catalunya

RICAPPS
Red de Investigación en Cronicidad Atención Primaria y Transición al Salud

Introducció

Les persones amb malalties cròniques amb necessitats complexes d'atenció (PCC) i aquelles amb malalties cròniques avançades (MACA) requereixen d'atencions específiques. Segons les seves característiques i necessitats de salut i socials, poden ser ateses de manera ambulatoria (a l'atenció primària i/o en d'altres nivells assistencials), al seu domicili (programa d'atenció domiciliària de la primària –ATDOM-) o en residències geriàtriques.

Objectiu

Determinar el risc de mortalitat en PCC i MACA segons l'entorn d'atenció, en comparació amb població no PCC ni MACA que s'atén de manera ambulatoria.

Material i mètodes

Anàlisi descriptiva de les persones de 65 anys o més assegurades a Catalunya l'any 2023. Els pacients es classifiquen en 9 grups segons diagnòstics actius de cronicitat (PCC, MACA o sense cronicitat) i segons l'entorn d'atenció: ambulatori, ATDOM o residència. Regressió de Poisson estratificada per sexe i edat (de 65 a 79 anys i 80 anys o més) amb la situació de cronicitat i entorn d'atenció com a exposició, ajustant per edats quinquenals per calcular els riscos relatius (RR) de mortalitat (IC95% i p valor associats).

Resultats


Distribució dels casos i prevalença de MACA i PCC

| Entorn d'atenció | Nombre de casos | | | | Prevalença | |
|------------------|-----------------|---------|------------------|-----------|------------|-------|
| | MACA | PCC | Sense cronicitat | Total | MACA | PCC |
| ATDOM | 4.482 | 37.214 | 25.569 | 67.265 | 6,7% | 55,3% |
| Residència | 3.145 | 24.257 | 22.493 | 49.895 | 6,3% | 48,6% |
| Ambulatori | 2.462 | 59.756 | 1.307.205 | 1.369.423 | 0,2% | 4,4% |
| Total | 10.089 | 121.227 | 1.355.267 | 1.486.583 | 0,7% | 8,2% |

El 75,6% de MACA estava en residències o en ATDOM. El 50,7% de PCC estava en residències o en ATDOM.

Es van observar diferències estadísticament significatives entre tots els grups analitzats.

Taxes de mortalitat (per 1000) segons l'entorn d'atenció, situació de cronicitat i edat



Risc relatiu de mortalitat segons l'entorn d'atenció i situació de cronicitat, per edat i sexe

| Situació de cronicitat | Entorn d'atenció | De 65 a 79 anys | | 80 anys o més | |
|------------------------|------------------|-----------------|-------|---------------|-------|
| | | Dones | Homes | Dones | Homes |
| MACA | ATDOM | 59,96 | 32,80 | 11,80 | 9,13 |
| | Residència | 48,19 | 29,84 | 12,46 | 9,67 |
| | Ambulatori | 49,95 | 21,41 | 8,95 | 7,18 |
| PCC | ATDOM | 17,41 | 12,18 | 5,64 | 5,00 |
| | Residència | 17,58 | 11,94 | 6,99 | 5,73 |
| | Ambulatori | 7,49 | 5,66 | 2,62 | 2,50 |
| Sense cronicitat | ATDOM | 11,30 | 10,26 | 4,06 | 4,09 |
| | Residència | 14,20 | 9,71 | 8,07 | 5,13 |

La categoria de referència pel càlcul del risc relatiu de mortalitat és població sense cronicitat que s'atén a l'entorn ambulatori.
Amb.: entorn ambulatori; ATDOM: atenció domiciliària; MACA: malaltia crònica avançada; PCC: pacient crònic complex; Resid.: residència

Conclusions

- Les persones amb MACA tenen un risc de mortalitat més elevat en tots els entorns d'atenció.
- El risc de mortalitat de PCC en ATDOM o residències és el doble que en l'entorn ambulatori.
- En majors de 80 anys, les diferències entre grups en el risc relatiu de mortalitat són menors.
- L'entorn d'atenció és un aspecte a tenir en compte en l'abordatge de persones amb malalties cròniques complexes i amb malalties cròniques avançades.

Contacte: mmedinap@gencat.cat