

HEM SUBSTITUÏT LA HIGIENE DE MANS PER L'ÚS DELS GUANTS?

E. Vidal¹; S. Gil¹; M. Torres¹; H. Herrera¹; N. Rubi¹; A. Aloy¹¹Consorci Sanitari del Maresme. Hospital de Mataró

Introducció

Les Precaucions Estàndard, recomanant l'ús dels guants com a protecció i prevenció de la transmissió d'agents patògens transmesos per contacte directe o indirecte a través de la sang i fluids biològics, pell no íntegra, secrecions o excrecions.

Durant la pandèmia de la COVID, s'ha observat un increment important de l'ús dels guants clínics als hospitals.

Volíem constatar si aquesta percepció es correcte.

Objectius

- Percentatge d'adequació dels guants d'ús clínic per part dels professionals assistencials seguint les recomanacions de l'OMS.
- Avaluar si l'ús dels guants a disminuït l'acompliment de la higiene de mans, pre i post pandèmia.

Material i mètode

Primer objectiu:

- **Estudi:** es realitzarà un tall observacional, d'un sol dia, amb horari de matí i tarda. En el moment en que el personal assistencial es posa els guants per fer una assistència al pacient, es valora la indicació de l'ús dels guants clínics segons les recomanacions de la OMS.
- **Període:** el tall es va fer el mes de juny
- **Població:** Criteris inclusió: personal assistencial: metges, infermeria, TCAI i tècnics sanitaris. Criteri exclusió: estudiants en pràctiques i professionals no assistencials.

Segon objectiu:

- **Estudi:** es realitzarà en el moment que es fa el tall de l'acompliment de la higiene de mans. En una de les accions esta definida, No higiene de mans/guants. Es valora l'any 2019 (pre- pandèmia) i 2023 (post-pandèmia).
- **Període:** els dos talls observacionals es van fer el mes de maig.
- **Població:** Criteris inclusió: personal assistencial: metges, infermeria, TCAI i tècnics sanitaris (TS). Criteri exclusió: estudiants en pràctiques i professionals no assistencials.

Resultats

S'han observat 308 professionals:

- Infermeres: 45.1% (139)
- TCAI: 42.5% (131)
- Metges: 7.1% (22)
- Tècnics sanitaris: 5.2% (16)

Taxa ÚS CORRECTE DE GUANTS:

47.4% (146 /308)


indicació d'ús CORRECTE:

- 1- Contacte amb la sang, fluids corporals, secrecions o excrecions 80.1%.
- 2- Motius infecciosos específics 15.8%.
- 3- Motius de salut laboral 2.7%.
- 4- Cal canviar-se els guants 1.4%.


Indicació d'ús INCORRECTE :

- 1- Contacte amb la sang, fluids corporals, secrecions o excrecions 80.1%.
- 2- Motius infecciosos específics 15.8%.
- 3- Motius de salut laboral 2.7%.
- 4- Cal canviar-se els guants 1.4%.

ÚS CORRECTE DE GUANTS PER CATEGORIA PROFESSIONAL



NO HIGIENE DE MANS PER L'ÚS DELS GUANTS



Objectius

1. La taxa d'ús correcte de guants és baixa 47.4%.
2. Indicacions d'us CORRECTE DELS GUANTS: 80,1% és per contacte amb sang /fluids corporals.
3. Indicacions d'us INCORRECTE DELS GUANTS: 71% no tenen cap indicació.
4. També poden constatar que els guants han substituït la higiene de mans. El 54.9% de les accions d'higiene de mans observades en que no s'ha fet, el professional portava guants.
5. Es necessari dissenyar estratègies multimodals amb tots els actors: qualitat, equips del control de la infecció, serveis mèdics i d'infermeria, salut laboral, servei de compres i medi ambient i des de les universitat i escoles, per poder reconduir l'ús indiscriminat de guants i potenciar la higiene de mans.